

PREVIEW CONCEITUAL

DR. ANDRÉ MORRELL

Cirurgia robótica guia visual para o paciente

Uma amostra de direção visual para organizar orientações de pré-operatório, internação, recuperação inicial e sinais de atenção em uma jornada clara, segura e revisável pela equipe médica.



PRÉ-OPERATÓRIO



CIRURGIA ROBÓTICA



RECUPERAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO



Transformar informação técnica em orientação visual consultável.



Material construído a partir da atuação pública do Instituto Morrell, com foco em ajudar o paciente a entender cada etapa: preparo, hospital, casa e sinais de alerta.

Clareza para a jornada do paciente

Organizar a comunicação da cirurgia robótica em uma sequência simples, segura e consultável.



Como o material
ajuda a equipe



alinha
expectativas



reduz dúvidas
repetidas



apoia secretaria
e concierge



padroniza a
orientação

O que precisa ficar claro antes da cirurgia



1. Documentos e exames

Levar identidade, resultados e documentos solicitados.



2. Jejum e medicações

Seguir a orientação individual da equipe.



3. Preparo intestinal quando indicado

Realizar apenas se houver orientação médica.



4. Acompanhante e transporte

Planejar ida, volta e apoio no primeiro dia.



5. Roupas, adornos e itens pessoais

Preferir conforto e retirar itens não essenciais.



6. Horário e local

Confirmar internação, hospital e chegada antecipada.



Orientações finais sempre dependem da equipe médica.

Primeiros dias em casa

Recuperação guiada para reduzir incerteza e facilitar a rotina.



Movimento

Caminhar em intervalos curtos e evitar esforço sem liberação.



Dor e ferida operatória

Usar a medicação prescrita e observar curativo, calor, vermelhidão ou secreção.



Alimentação e hidratação

Preferir dieta leve no início e manter boa hidratação.



Intestino / eliminação

Atenção a gases, evacuação e desconfortos fora do esperado.



Quando a equipe ganha tempo



menos imprevisto



respostas mais padronizadas



melhor apoio à secretaria

SINAIS DE ATENÇÃO

Quando avisar a equipe



1.

Febre persistente

Acima de 38°C por
mais de 24h.



2.

Vômitos repetidos

Impedindo a ingestão
de líquidos.



3.

Dor em piora

Não aliviada com a
medicação orientada.



4.

Falta de ar

Respiração rápida ou
dificuldade para respirar.



Sangramento ou secreção

Perda de sangue ou secreção
em quantidade ou odor.



Dificuldade para hidratar ou alimentar

Recusa persistente ou sinais
de desidratação.



PRÓXIMO PASSO

Esta é uma amostra de
direção visual. O material
final pode ser personalizado
conforme especialidade,
rotina da equipe e
orientações do
Instituto Morrell.

REFERÊNCIA VISUAL FIGUEIRA

www.figueirart.com/figlab

